

Lista odmian buraka cukrowego na sezon siewny 2015
oraz ich charakterystyka.

Florimond Desprez

Danube Rh

Rejestracja w 2011 roku.

- Odmiana diploidalna, w typie normalnym,
- Tolerancyjna na rizomanię,
- Dobre, wyrównane wschody,
- Odporna na wydawanie pośpiechów,
- dobry plon korzeni i dobra polaryzacja,
- wysoki plon cukru technologicznego,
- dobre właściwości przerobowe.

KHBC

Finezja Rh Cr

Rejestracja w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno-plennym,

- odporna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- nie wytwarza pośpiechów,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- dobra jakość przerobowa,
- niski udział korzeni drobnych i nietypowych.

Jagusia Rh

Rejestracja w 2010 roku.

Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- równomierne i szybkie wschody,
- mała skłonność do wydawania pośpiechów,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- niska zawartość szkodliwego azotu,
- niski udział korzeni drobnych i nietypowych.

Jampol Rh Cr

Rejestracja w 2013 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- dobra odporność na wydawanie pośpiechów,
- wysoki plon cukru technologicznego,
- niska zawartość melasotworów,
- mały udział korzeni drobnych i nietypowych.

Janosik Rh

Rejestracja w 2009 roku.

Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- brak skłonności do wydawania pośpiechów,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- niska zawartość melasotworów,
- dobre właściwości przerobowe.

KWS

Primavera Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2013 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno-plennym,

- tolerancyjna na rizomanię, chwościk burakowy i mączniak prawdziwy buraka,
- wysoki i stabilny w latach plon korzeni,
- bardzo wysoki plon cukru technologicznego,
- niska zawartość szkodliwego azotu w korzeniach
- dobra jakość przetwórcza,
- niska skłonność do wydawania pośpiechów,
- regularny kształt korzeni ułatwiający zbiór.

Natura Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię, o podwyższonej odporności na chwościka burakowego i mączniaka,
- bardzo niska zawartość szkodliwego azotu i sodu w soku korzeni,
- bardzo wysoki plon cukru z 1 ha,
- małe zanieczyszczenie korzeni glebą,
- odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 roku.

Primadonna Rh

Rejestracja w Polsce w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- zalecana na późniejszy zbiór,
- wysoki plon cukru i korzeni,
- dobra jakość przetwórcza, niska zawartość azotu szkodliwego w korzeniach,
- wyrównane korzenie, mały udział korzeni drobnych - niskie straty przy zbiorze,
- dobre wykorzystanie nawożenia mineralnego,
- szybka regeneracja rozety liściowej – podwyższona odporność na choroby liści.

Elvira Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie plennym,

- tolerancyjna na rizomanię, chwościk burakowy i mączniak,
- odporna na pośpiechy,
- wyrównany kształt korzeni,
- małe straty przy zbiorze,
- niska zawartość szkodliwego azotu,
- zalecana na późniejszy zbiór.

Maribo

Gallant Rh Cr A E

Rejestracja w Polsce w 2013 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy, brunatną plamistość liści i mączniaka prawdziwego,
- tolerancyjna na Aphanomyces odpowiedzialny za gnicie korzeni,
- wysoki plon korzeni,
- dobra zawartość cukru,
- niska zawartość azotu &-aminowego,
- sodu i potasu zbliżona do wzorca.
- dobra jakość przerobowa.

Pikador Rh Cr A E

Rejestracja w Polsce w 2013 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy, brunatną plamistość liści i mączniaka prawdziwego,
- tolerancyjna na Aphanomyces odpowiedzialny za gnicie korzeni,
- plon korzeni na poziomie wzorca,
- zawartość cukru powyżej średniej,
- niska zawartość melasotworów,
- dobra jakość przetwórcza.
- do zbioru - początek października

Milton Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka tolerancja na chwościk burakowy,
- plon korzeni i technologiczny cukru powyżej średniego,
- niska zawartość składników melasotwórczych,
- dobra jakość przerobowa,
- charakterystyczne ulistnienie ułatwia zbiór.

Sesvanderhave

Manitou Rh

Rejestracja w Polsce w 2013 roku.

Odmiana diploidalna w typie cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka zawartość cukru przy wczesnych zbiorach,
- wysoka czystość soków,
- bardzo dobra jakość przetwórcza,

Expert Rh

Rejestracja w Polsce w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- daje gwarancję wysokiego plonu we wszystkich terminach zbioru,
- wysoki plon cukru z ha,
- charakteryzuje go odporność na stres, w tym także na okresowo występujące susze,
- niska zawartość melasotworów,

Alarm Rh

Rejestracja w Polsce w 2013 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoki plon korzeni i cukru z ha,
- wysoka czystość soków,
- dobra jakość przerobowa,
- zalecana do zbioru w terminie optymalnym i opóźnionym.

Strube

Sokrates Rh

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka zawartość cukru i dobry plon korzeni,
- wysoka zawartość cukru oczyszczonego,
- niska zawartość melasotworów,
- odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 roku.

Gellert Rh

Rejestracja w Polsce w 2013 roku.

Odmiana diploidalna w typie cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- dobra zdrowotność liści,
- wysoka zawartość cukru,
- wysoki plon cukru oczyszczonego,
- niska zawartość melasotworów,
- dobra jakość przetwórcza.

Sinan Rh

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym do normalno-plennego,

- tolerancyjna na rizomanię,
- plon korzeni wysoki,
- dobra zawartość cukru,
- niska zawartość melasotworów, zwłaszcza azotu szkodliwego,
- bardzo wysoki plon cukru technologicznego.

Syngenta

Alegria Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- bardzo dobra zdrowotność liści wynikająca z wysokiej tolerancji na chwościka burakowego,
- wysokie plony korzeni powyżej średniej, dobra zawartość cukru,
- wyrównany, kształtny korzeń,
- nadaje się do średniego i późniejszego zbioru

SY Belana Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- deklarowana tolerancja na chwościka burakowego,
- dobrze sobie radzi z okresowym niedoborem wilgoci,
- bardzo dobra zdrowotność liści,
- wysokie plony korzeni,
- dobra zawartość cukru,
- wyrównany, kształtny korzeń,
- niskie straty podczas zbioru.

Silvetta Rh Cr

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka tolerancja na chwościka burakowego - bardzo dobra zdrowotność liści,
- wysoki plon technologiczny cukru,
- nadaje się do średniego i późniejszego zbioru.

WHBC

Huzar Rh

Rejestracja w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- szybkie i wyrównane wschody polowe,
- dobre zagłębienie korzeni w ziemi ułatwia zbiór,
- wysokie plony korzeni uzyskuje pod koniec okresu zbioru.

Telimena Rh

Rejestracja w 2013 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- szybkie i wyrównane wschody polowe,
- gładki stożkowaty korzeń,
- dobre zagłębienie korzeni w ziemi ułatwia zbiór,
- wysokie plony korzeni uzyskuje pod koniec okresu zbioru.

Tadeusz Rh

Rejestracja w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- szybkie i wyrównane wschody polowe,
- wysokie plony korzeni,
- wysokie plony cukru uzyskuje pod koniec okresu zbioru.

Odmiany tolerancyjne na mątwika burakowego.

Stanowią uzupełnienie listy odmian preferowanych do zasiewów plantacji w 2015 roku na potrzeby plantatorów, których pola są zagrożone występowaniem tego agrofaga.

Sława Rh N - KWS

Rejestracja w Polsce w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię i mątwik burakowy,
- zalecana na stanowiska zagrożone wystąpieniem nicieni (częsta uprawa buraków, rzepak w zmianowaniu) oraz na polach, na których analiza gleby wskazuje na występowanie mątwika,
- odporna na wydawanie pośpiechów,
- bardzo dobra jakość przetwórcza,
- stosunkowo wysoki plon liści.

Charly Rh N - Strube

Rejestracja w UE w 2010 roku.

Sprzedawana w Polsce z listy europejskiej

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię i mątwika burakowego,
- zalecana na stanowiska zagrożone wystąpieniem nicieni,
- wysoka polaryzacja,
- niska zawartość azotu alfa-aminowego,
- wysoki plon technologiczny cukru.

** rok rejestracji, typ użytkowy i tolerancja wg COBORU,*

*** pozostałe informacje dotyczące odmian z materiałów poszczególnych firm nasiennych.*