

Polski CukroVit **AZOTOWY**

Koncentrat nawozowy azotowo-magnezowy przeznaczony do nawożenia dolistnego buraków, zbóż, rzepaku, ziemniaków, warzyw oraz drzew i krzewów owocowych.

CukroVit **AZOTOWY**

zawiera dobrze przyswajalne składniki odżywcze wpływające na zwiększenie ilości i jakości plonu roślin.

CukroVit **AZOTOWY**

skutecznie likwiduje i zapobiega powstawaniu objawów niedoboru azotu i magnezu.

CukroVit **AZOTOWY**

stymuluje prawidłowy rozwój roślin i lepsze wykorzystanie nawozów dogłębnych oraz wzmacnia odporność roślin na stresy.



SKŁAD:

składnik pokarmowy	[% m/m]	[% obj.]	g/l nawozu
Azot całkowity (N)	26,0	34,2	342
Azot azotanowy (NO ₃)	1,60	6,15	61,5
Azot amonowy (NH ₄)	2,45	3,25	32,5
Azot amidowy (NH ₂)	18,80	24,8	248
Tlenek magnezu rozp. w wodzie (MgO)	3,10	4,08	40,8



KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
e-mail ksc@polski-cukier.pl, www.polski-cukier.pl

Polski CukroVit AZOTOWY

STOSOWANIE NAWOZU:

Roślina	Terminy oprysków	Dawka nawozu [l/ha]
Burak cukrowy i pastewny	faza 4÷10 liści	2÷6
	10÷14 dni później	2÷10
	przed zwarcim rzędów	
Rzepak	ruszenie wegetacji	4÷10
	10÷14 dni później	
	przed zwarcim rzędów	
Ziemniak	2÷3 opryski przed kwitnieniem	3÷10
	po kwitnieniu	
Warzywa kapustne, korzeniowe i inne	2÷3 tyg. po wschodach	3÷10
	co 7÷10 dni – dwa zabiegi	
	14 dni przed zbiorem	
Truskawka	przed kwitnieniem	2÷5
	po kwitnieniu	
	10÷14 dni później	
Drzewa i krzewy owocowe	przed kwitnieniem	7÷10
	po kwitnieniu	
	10÷14 dni później	
Inne	1÷1,5 litra nawozu na 100 litrów cieczy, co 10-14 dni	
Ilość cieczy użytkowej [l/ha]: 200-300 – uprawy polowe; 400-1000 – sady		

Uwaga!

- zabiegi wykonywać rano lub wieczorem, przy temperaturze maksymalnej 25°C,
- temperatura cieczy użytkowej minimum 10°C,
- w przypadku zamiaru łączenia nawozu z innym środkiem, należy przeprowadzić próbę mieszania i sprawdzić reakcję roślin na mieszaninę.



KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
e-mail ksc@polski-cukier.pl, www.polski-cukier.pl