

Polski CukroVit 16-16-16

z kompleksem ANTYSTRES

Nawóz dolistny o wysokiej zawartości i zrównoważonych proporcjach podstawowych składników pokarmowych NPK, wzbogacony w mikroelementy.

Składniki nawozu		% wagowy
Makroelementy	Azot (N)	16
	Pięciotlenek fosforu (P_2O_5)	16
	Tlenek potasu (K_2O)	16
Mikroskładniki rozp. w wodzie	Bor (B)	0,05
	Miedź (Cu)	0,06
	Żelazo (Fe)	0,11
	Mangan (Mn)	0,01
	Molibden (Mo)	0,001
	Cynk (Zn)	0,04



NAWÓZ ZAWIERA ANTYSTRES KOMPLEKS



Kompleks ANTYSTRES zawiera w swoim składzie substancje, które:

- produkowane są przez rośliny po wystąpieniu czynnika stresowego (susza, wysoka temperatura, chłód),
- dostarczone roślinie przed zadziałaniem czynnika stresowego zapobiegają zahamowaniu rozwoju roślin związanego z wystąpieniem stresu i stymuluje ją do szybszej regeneracji w przypadku przedłużających się niekorzystnych warunków uprawy,
- zwiększają wykorzystanie składników pokarmowych z gleby oraz z nawozów.

Nawóz Polski CukroVit 16-16-16

- silnie stymuluje rozwój roślin, szczególnie w okresach intensywnego wzrostu,
- zalecany w sytuacjach ograniczonego pobierania składników odżywczych z gleby,
- stymuluje szybszą regenerację roślin w przypadku uszkodzeń,
- usprawnia gospodarkę wodną roślin,
- przyczynia się do wzrostu plonu i poprawy jego jakości.

Dawkowanie: 3-5kg /ha.



KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
e-mail ksc@polski-cukier.pl, www.polski-cukier.pl

Polski CukroVit 16-16-16 z kompleksem ANTYSTRES

Roślina	Termin oprysków	Dawka nawozu [kg/ha]
Burak cukrowy i pastewny	faza 4÷10 liści	3÷4,5
	10÷14 dni później	
	przed zwraniem rzędów	3,5÷5
Rzepak, len	ruszenie wegetacji	3÷4,5
	10÷14 dni później	
	faza zielonego pąka	
Zboża	krzewienie	2÷4
	strzelanie w źdźbło	3÷4,5
	kłoszenie	
	po kwitnieniu	
Ziemniak	pełnia wschodów	3÷4,5
	przed kwitnieniem	
	po kwitnieniu	
Kukurydza	faza 6÷8 liści	3÷4,5
	co 10÷14 dni – dwa zabiegi	
Strączkowe	przed kwitnieniem	3÷4,5
	po kwitnieniu	
	7÷10 dni później	
Truskawka	koniec kwitnienia	3÷4
	początek wzrostu owoców	
	po 7÷10 dniach	
Drzewa i krzewy owocowe	przed kwitnieniem	5÷10
	po kwitnieniu	
	10÷14 dni później	
Warzywa w gruncie	2÷3 tyg. po wschodach	3÷4
	co 10÷14 dni – dwa zabiegi	
Warzywa pod osłonami pomidor, papryka, ogórek, sałata, rzodkiewka, seler, szczypiorek i inne	3 liście – produkcja rozsady	0,5÷1 l na 100 l cieczy
	2÷3 opryski, co 10÷14 dni	1÷1,5 l na 100 l cieczy
Rośliny ozdobne i inne	0,5÷1,5 litra nawozu na 100 litrów cieczy	

Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe - 300-500 l/ha; sady - 400-1000 l/ha



KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
e-mail ksc@polski-cukier.pl, www.polski-cukier.pl