

Fungicydy dopuszczone do ochrony buraka cukrowego przed Cercospora – beticola

(stan na 20 maj 2013 r.)

Fungicyd	Substancja aktywna	Dawka (kg, l/ha)	Karencja (liczba dni)
Preparaty o działaniu kontaktowym			
Antracol 70 WG	propineb	2,0-2,5	7
MAC-Mankozeb 75% WG	mankozeb	2,0 – 3,0	14
Dithane Neo-Tec 75 WG	mankozeb	2,0 – 3,0	14
Miedzian 50 WP	tlenochlorek miedzi	5,0	7
Miedzian Extra 350 SC	tlenochlorek miedzi	5,0-6,0	7
Preparaty o działaniu systemicznym			
Alert Solo 250 EW	flusilazol	0,4 – 0,5	35
Allegro 250 SC	krezoksym metylu + epoksykonazol	0,7 – 1,0	35
Capitan 250 EW	flusilazol	0,4 – 0,5	35
Duett Star 334 SE	fenpropimorf + epoksykonazol	1,0	35
Duett Ultra 497 SC	tifanat metylowy + epoksykonazol	0,5 – 0,6	35
Eminent 125 SL	tetrakonazol	0,8	28
Intizan SC	tifanat metylowy + epoksykonazol	0,5 - 0,6	35
Matador 303 SE	tiofanat metylowy + tetrakonazol	1,25 – 1,5	35
Moderator 303 SE	tiofanat metylowy + tetrakonazol	1,25 - 1,5	35
Optan 183 SE	piraklostrobina + epoksykonazol	0,5 – 0,7	35
Orian	tebukonazol	0,8	35
Orius Extra 250 EW	tebukonazol	0,8	35
Rekord 125 SC	epoksykonazol	1,0	35
Rubric 125 SC	epoksykonazol	1,0	35
Safir 125 SC	epoksykonazol	1,0	35
Soprano 125 SC	epoksykonazol	1,0	35
Syrius 250 EW	tebukonazol	0,8	35
Tango Star 334 SE	fenpropimorf + epoksykonazol	1,0	35
Tebu 250 EW	tebukonazol	0,8	35
Topsin M 500 SC	tiofanat metylowy	1,2	14
Tyberius 250 EW	tebukonazol	0,8	35
Yamato 303 SE	tiofanat metylowy + tetrakonazol	1,25 – 1,5	35