

## **Charakterystyka odmian z listy KSC S.A. w 2014 roku**

### **Florimond Desprez**

#### **Danube Rh**

Rejestracja w 2011 roku.

Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

- Tolerancyjna na rizomanię,
- Dobre, wyrównane wschody,
- Odporna na wydawanie pośpiechów,
- dobry plon korzeni i dobra polaryzacja,
- wysoki plon cukru technologicznego,
- dobre właściwości przerobowe.

### **KHBC**

#### **Janosik Rh**

Rejestracja w 2009 roku.

Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- brak skłonności do wydawania pośpiechów ,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- niska zawartość melasotworów,
- dobre właściwości przerobowe.

#### **Jagusia Rh**

Rejestracja w 2010 roku.

Odmiana diploidalna, w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- z podwyższoną tolerancją na chwościk burakowy,
- równomierne i szybkie wschody,
- mała skłonność do wydawania pośpiechów,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- niska zawartość szkodliwego azotu,
- niski udział korzeni drobnych i nietypowych.

#### **Finezja Rh Cr**

Rejestracja w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno-plennym,

- odporna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- nie wytwarza pośpiechów,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- dobra jakość przerobowa,
- niski udział korzeni drobnych i nietypowych.

#### **Szach Rh**

Rejestracja w 2012 roku.

Odmiana diploidalna, w typie normalnym do normalno-plennego,

- odporna na rizomanię,
- brak skłonności do wydawania pośpiechów ,
- wysoki plon korzeni i cukru technologicznego,
- niska zawartość melasotworów
- doskonałe właściwości przerobowe,
- odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 roku.

## **KWS**

### **Danuśka Rh**

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka zawartość cukru i wysoki wydatek cukru technologicznego,
- doskonała jakość przetwórcza - niski poziom azotu szkodliwego w soku,
- małe ulistnienie i wysoka efektywność nawożenia,
- wyrównane wystawianie główek z gleby, mały udział korzeni drobnych.

### **Natura Rh Cr**

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- o podwyższonej odporności na chwościka burakowego i mączniaka,
- bardzo niska zawartość szkodliwego azotu i sodu w soku korzeni,
- bardzo wysoki plon cukru z 1 ha,
- małe zanieczyszczenie korzeni glebą,
- odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 roku.

### **Primadonna Rh**

Rejestracja w Polsce w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- zalecana na późniejszy zbiór,
- wysoki plon cukru i korzeni ,
- dobra jakość przetwórcza, niska zawartość azotu szkodliwego w korzeniach,
- wyrównane korzenie, bardzo mały udział korzeni drobnych - niskie straty przy zbiorze,
- dobre wykorzystanie nawożenia mineralnego,
- szybka regeneracja rozety liściowej – podwyższona odporność na choroby liści.

### **Elvira Rh Cr**

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym do normalno-plennego,

- tolerancyjna na rizomanię, chwościk burakowy i mączniak,
- odporna na pośpiechy,
- najwyższy plon korzeni wśród odmian zarejestrowanych w 2012 roku,
- wyrównany kształt korzeni,
- małe straty przy zbiorze,
- bardzo niska zawartość szkodliwego azotu,
- zalecana na późniejszy zbiór.

## **Maribo**

### **Nancy Rh Cr**

Rejestracja w Polsce w 2006 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym,

- tolerancyjna na rizomanię ,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- bardzo dobrze przystosowana do warunków klimatycznych Polski,
- wyrównane wschody,
- dobra zdrowotność liści,
- dobry plon korzeni i wysoka zawartość cukru.

### **Milton Rh Cr**

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka tolerancja na chwościk burakowy,
- plon korzeni i technologiczny cukru powyżej średniego,
- niska zawartość składników melasotwórczych,
- dobra jakość przerobowa,
- charakterystyczne ulistnienie ułatwia zbiór.

### **Vistula Rh Cr**

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- wyrównane wschody,
- zawartość cukru i plon technologiczny powyżej wzorca,
- niska zawartość melasotworów,
- dobra jakość technologiczna,

## **SESVANDERHAVE**

### **Expert Rh**

Rejestracja w Polsce w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- daje gwarancję wysokiego plonu we wszystkich terminach zbioru,
- bardzo wysoki plon cukru,
- charakteryzuje go odporność na stres, w tym także na okresowo występujące susze.

### **Pasja Rh**

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka zawartość cukru,
- bardzo wysoki plon cukru z ha,
- niska zawartość melasotworów,
- dobra jakość przetwórcza,
- odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 roku.

### **Argument Rh Cr**

Rejestracja w Polsce w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- tolerancyjna na chwościk burakowy,
- zalecana do zbioru w terminie optymalnym i opóźnionym,
- wysoki plon korzeni przy średniej zawartości cukru,
- dobry plon cukru z ha.

## **Strube**

### **Schubert Rh**

Rejestracja w Polsce w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- dobra zdrowotność liści,
- wysoki plon cukru technologicznego,
- niska zawartość melasotworów.

### **Sokrates Rh**

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - cukrowym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka zawartość cukru i dobry plon korzeni,
- wysoka zawartość cukru oczyszczonego,
- niska zawartość melasotworów,
- odmiana wzorcowa w doświadczeniach COBORU w 2012 roku.

### **Sinan Rh**

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- plon korzeni wysoki,
- dobra zawartość cukru,
- niska zawartość melasotworów, zwłaszcza azotu szkodliwego,
- bardzo wysoki plon cukru technologicznego.

### **Syngenta**

#### **Alegria Rh Cr**

Rejestracja w Polsce w 2012 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- odporna na rizomanię,
- bardzo dobra zdrowotność liści wynikająca z wysokiej tolerancji na chwościka burakowego,
- wysokie plony korzeni powyżej średniej, dobra zawartość cukru,
- wyrównany, kształtny korzeń,
- nadaje się do średniego i późniejszego zbioru

#### **Silvetta Rh Cr**

Rejestracja w Polsce w 2010 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- wysoka tolerancja na chwościka burakowego - bardzo dobra zdrowotność liści,
- wysoki plon technologiczny cukru,
- nadaje się do średniego i późniejszego zbioru.

### **WHBC**

#### **Tadeusz Rh**

Rejestracja w 2011 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- szybkie i wyrównane wschody polowe,
- wysokie plony korzeni,
- wysokie plony cukru uzyskuje pod koniec okresu zbioru.

#### **Huzar Rh**

Rejestracja w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalno - plennym,

- tolerancyjna na rizomanię,
- szybkie i wyrównane wschody polowe,
- dobre zagłębienie korzeni w ziemi ułatwia zbiór,
- wysokie plony korzeni uzyskuje pod koniec okresu zbioru.

### **Odmiany tolerancyjne na mątwika burakowego.**

Stanowią uzupełnienie listy odmian preferowanych do zasiewów plantacji w 2014 roku na potrzeby Plantatorów, których pola są zagrożone występowaniem tego agrofaga.

#### **Sława Rh N - KWS**

Rejestracja w Polsce w 2009 roku.

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię i mątwik burakowy,
- zalecana na stanowiska zagrożone wystąpieniem nicieni (częsta uprawa buraków, rzepak w zmianowaniu) oraz na polach, na których analiza gleby wskazuje na występowanie mątwika,
- odporna na wydawanie pośpiechów,
- bardzo dobra jakość przetwórcza,
- stosunkowo wysoki plon liści.

#### **Charly Rh N - Strube**

Rejestracja w UE w 2010 roku.

Sprzedawana w Polsce z listy europejskiej

Odmiana diploidalna w typie normalnym,

- tolerancyjna na rizomanię i mątwika burakowego,
- zalecana na stanowiska zagrożone wystąpieniem nicieni,
- wysoka polaryzacja,
- niska zawartość azotu alfa-aminowego,
- wysoki plon technologiczny cukru.

*\* rok rejestracji, typ użytkowy i tolerancja wg COBORU,*

*\*\* pozostałe informacje dotyczące odmian z materiałów poszczególnych firm nasiennych.*