

Skuteczność substancji czynnych herbicydów stosowanych w ochronie plantacji buraka cukrowego

Zwalczane chwasty	Metamitron	Etofumesat	Lenacyl	Fenmedifam	Chlopyralid	Chinomerak	Dimetenamid-P	Metamitron + Chinomerak	Etofumesat + Fenmedifam	Etofumesat + Fenmedifam + Lenacyl	Dimetenamid-P + Chinomerak	Florpiroksyfen benzylu
Blekot pospolity	+				++	++	++	++			+++	+++
Bodziszi							++		+	++	++	++
Bylica pospolita					+	+		+			+	
Chwastnica jednostronna							++				++	
Dymnica pospolita	++	+	++	+	+		++	++	++	++	++	
Fiołek polny	+++			+				+++	+	++		
Gorczyca polna	++		+	++			+	++	++	++	++	
Gwiazdnica pospolita	+++	+++	+	++				+++	+++	+++	+++	++
Jasnoty	++			+++			+++	++	+++	+++	+++	+++
Komosa biała	+++*	+	++	+			+	+++*	+	+++	+	++
Ostrożeń polny					+++						+	+
Pokrzywa żegawka												+++
Poziewnik szorstki	++		+	++				++	++	+++	++	
Przetaczniki	+	+		+			+++	+	++	+++	+++	
Przytulia czepna	+	+++		+		++		+++	++	++	+++	++
Psianka czarna	++*			++	+++		++	++*	++	++	+++	+
Rdest plamisty	+	+		+		+	+	+	++		+	
Rdest ptasi	+	+			+	+		+	+	+	+	
Rdest szczawiolistny						+	++	+	+	+	+	
Rdestówka powojowata	+	+		+	+	+	+	++	++	++	+	
Rumian polny	++		+		++			++		+	++	
Rzodkiew świrzepa	++			++				++	++	++	++	
Samosiewy rzepaku	++		++	+				++	+	++	+	
Samosiewy rzepaku (CL)	++		++	+				++	+	++	+	
Skrzyp polny												
Starzec zwyczajny				++	++	+		+	++	++		
Szarłat szorstki	++*	++	+	+			++	++*	++	++	+++	++
Szczyr roczny		++	++				+	+	++	++	+	++
Tasznik pospolity	+++	+	+	++			+	+++	++	+++	+	
Tobołek polny	+++		+	+++			+	+++	+++	+++	+	
Włośnica							++				++	
Żółtlica drobnokwiatowa	++	+	+	++	+++		+++	++	++	++	++	

+++ - Bardzo dobra skuteczność (99%)

++ - Dobra skuteczność (95%)

+ - Niewystarczająca skuteczność

-Chwasty stanowiące duży problem w uprawie buraka cukrowego

(CL) - Samosiewy rzepaku Clearfield

* - przy częstym stosowaniu istnieje ryzyko powstawania odporności!